




CimoCid



Alkoholische Lösung zur Händedesinfektion

Einsatzbereich

Zur Hygienischen Händedesinfektion in medizinischen Einrichtungen in Schulen, Kindergärten und Heimen und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen.

Anwendung

Einreiben in die trockenen Hände*. Zur hygienischen Händedesinfektion Hände ausreichend mit CimoCid benetzen und ohne Wasserzugabe 30 Sekunden nach dem Standardverfahren verreiben.

Technische Informationen

Karton mit 12 Euroflaschen á 1.000 ml Art.-Nr. 00599
 Karton mit 6 V10 Flaschen á 1.000 ml Art.-Nr. 00598

Zubehör

Wandspender für 1.000 ml Euroflaschen Art.-Nr. 80054
 Handdispenser für 1.000 ml Euroflaschen Art.-Nr. 88019

Wirkstoffe

100 g enthalten 63,1 g Propan-2-ol und 2,9 g Ethanol

Haltbarkeit nach Anbruch 6 Monate.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS02, GHS07

Baua Reg.-Nr. N-58085

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Hygienische Händedesinfektion bakterizid und levurozid	konz. 30 Sek.*	gem. VAH/DGHM, EN 1500
tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek.	gem. EN 14348 hohe und niedrige Belastung
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 15 Sek.**	gem. RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004
Rotaviren	konz. 30 Sek.	gem. EN 14476 ohne Belastung
Noroviren (Murines Norovirus MNV)	konz. 30 Sek.	gem. EN 14476 niedrige Belastung
* Die Hände während der gesamten Applikationszeit durch das konzentrierte Präparat feucht halten.		
** Für die hygienische Händedesinfektion ist eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden einzuhalten.		

Produkteigenschaften

- VAH-gelistet
- Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gem. RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004
- Wirksam gegen Rota- und Noroviren
- Frei von Duft-, Farb- und weiteren Zusatzstoffen
- Aufgeführt in der IHO Viruzidie-Liste

Hinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter lt. lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Verwertung zuführen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

pH conc 0 2 4 8 10 12 14

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0416

DR.SCHNELL Chemie GmbH
 Taunusstraße 19 · D-80807 München
 Tel. +49/(0)89/35 06 08 0
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE