

Desinfektionsreiniger

Starke Reinigungsleistung, rückstandsfrei abspülbar

Produktbeschreibung:

TAPIRA Desinfektionsreiniger reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsschritt. Das Produkt ist geeignet für den Einsatz auf allen Flächen (Fußböden, Wände, Arbeitsflächen, Gerätschaften etc.), speziell in lebensmittelverarbeitenden und -produzierenden Unternehmen. Alkalischer pH-Wert, gute Löslichkeit von Fett- und Ölverschmutzungen, hervorragende Aufschäumeigenschaften. Nach Euro-Normen geprüft, wirksam gegen Bakterien (inklusive Salmonellen, Listerien) und Pilze (inklusive Aspergillus niger).

Anwendung und Dosierung:



Flächen und Gerätschaften durch Aufbringen einer gebrauchsfertigen Lösung behandeln. Im Niederdruck-, Wisch- oder Einlegeverfahren anwendbar. Auf vollständige Benetzung der Flächen achten und nach Ablauf der Einwirkzeit mit ausreichend klarem Wasser ab- bzw. nachspülen. Ausrüstung gut mit Wasser reinigen.

- Reinigung: 5-10 ml auf 1 Liter Wasser geben, Einwirkzeit 5 Minuten.
- Desinfektion: Mikrobiologische Wirksamkeit beachten!

Hinweis:

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. BauA-Reg.-Nr. N-85117.

Beim Versprühen Aerosole nicht einatmen. Vor Kälte schützen. Die Haltbarkeit der Anbruchgebinde entspricht bei sachgemäßem Umgang und Lagerung dem auf dem Gebinde aufgedruckten Haltbarkeitsdatum.

pH-Wert in Konzentrat:

ca. 9

Materialverträglichkeit/ Korrosionstests:

Die Verträglichkeit mit Edelstahl, Kupfer, Messing und Aluminium ist sehr gut, die Verträglichkeit mit Zink gut.

Mit Eisen (Werkzeugstahl) und Polycarbonat sollten die Produktkontakte nur kurzzeitig sein, danach ist es gründlich abzuspuhlen, da eine Verträglichkeit bei längerem Kontakt nicht gegeben ist.

Die getesteten Kunststoffe (PE, PET, PVC und weitere) und Kautschuke (z.B. Nitril-, Chloroprene-, Natur-, Isobuten-Kautschuk) sind gut bis sehr gut verträglich.

Exklusiv hergestellt für:

GVS GROUP

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN1276 - hohe Belastung	0,5 % (5 ml/l) 20 °C	5 Min.
bakterizid EN1276 - hohe Belastung	0,5 % (5 ml/l) 10 °C	30 Min.
bakterizid EN13697 - hohe Belastung	0,5 % (5 ml/l) 20 °C	30 Min.
bakterizid EN13697 - hohe Belastung	1 % (10 ml/l) 10 °C	60 Min.
Listeria monocytogenes gemäß DVG	0,5 % (5 ml/l) 20 °C	5 Min.
Salmonella spp. gemäß DVG	0,75 % (7,5 ml/l) 20 °C	15 Min.
fungizid EN1650 - hohe Belastung	0,5 % (5 ml/l) 20 °C	60 Min.
fungizid EN13697 - hohe Belastung	0,5 % (5 ml/l) 20 °C	60 Min.
fungizid EN1650 - hohe Belastung	1 % (10 ml/l) 10 °C	60 Min.
fungizid EN13697 - hohe Belastung	2 % (20 ml/l) 10 °C	60 Min.
Vaccinia Virus gemäß DVV	0,5 % (5 ml/l)	5 Min.
Vaccinia Virus gemäß DVV - hohe Belastung	0,75 % (7,5 ml/l)	5 Min.